

## Opis choroby \*

### Definicja

\*Pierwotny czerniak ośrodkowego układu nerwowego jest rzadkim nowotworem opon mózgowo-rdzeniowych, wywodzącym się melanocytów pajęczynówki. Zlokalizowany jest zwykle w okolicy okołordzeniowej lub górnym odcinku szyjnym, przy czym nie stwierdza się czerniaka poza ośrodkowym układem nerwowym. Guz ma zazwyczaj litą masą o ciemnej barwie, często zawiera obszary krwotoczne lub martwicze, zbudowane z warstw komórek pleomorficznych z widocznymi jąderkami, licznymi figurami mitotycznymi i naciekaniem mięszu. Guz wewnątrzczaszkowy może dawać objawy podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, zależnie od lokalizacji ogniskowe objawy neurologiczne, drgawki lub może wystąpić krwotok podpajęczynówkowy; natomiast guz kręgosłupa może objawiać się bólem pleców, osłabieniem mięśni, drętwieniem, porażeniami lub nietrzymaniem moczu.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

Malignant melanoma of meninges

Primary melanoma of the CNS

#### Kod ORPHA

252050

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

C70.9

#### Kod ICD11

-

---

#### [\\*Źródło](#)

orphanet