

Lipoma okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Kod Orpha: 268838 Kod OMIM:

Opis choroby *

Definicja

*Lipoma okolicy lędźwiowo-krzyżowej jest rzadką wadą, związaną z nieprawidłowym zamykaniem cewy nerwowej, w której nisko położony stożek rdzenia uwięziony jest przez tłuszczakowatą masę znajdującą się w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (zawierającą tkankę tłuszczową, włókna nerwowe, pasma oponowe i sznury włókniste), która obejmuje nić końcową (rdzenia) i zróżnicowaną liczbę grzbietowych i brzusznych włókien korzeni nerwowych, co zwykle prowadzi do zaburzeń czuciowo-ruchowych oraz do dysfunkcji jelit i/lub pęcherza moczowego. Często występują znamiona skórne, brak lub osłabienie odruchów ścięgniastych oraz wady stóp (np. stopa koślawa i wydrążona).

Dane

Klasyfikacja

Wada morfologiczna

Kod ORPHA
268838

Kod OMIM
-

Kod ICD10
-

Kod ICD11
-

[*Źródło](#)

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Dostępna na stronie www.orphanet.pl