

# Lipoma okolicy lędźwiowo-krzyżowej

## Kod Orpha: 268838 Kod OMIM:

### Opis choroby \*

#### Definicja

\*Lipoma okolicy lędźwiowo-krzyżowej jest rzadką wadą, związaną z nieprawidłowym zamykaniem cewy nerwowej, w której nisko położony stożek rdzenia uwięziony jest przez tłuszczakowatą masę znajdującą się w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (zawierającą tkankę tłuszczową, włókna nerwowe, pasma oponowe i sznury włókniste), która obejmuje nić końcową (rdzenia) i zróżnicowaną liczbę grzbietowych i brzusznych włókien korzeni nerwowych, co zwykle prowadzi do zaburzeń czuciowo-ruchowych oraz do dysfunkcji jelit i/lub pęcherza moczowego. Często występują znamiona skórne, brak lub osłabienie odruchów ścięgniastych oraz wady stóp (np. stopa koślawa i wydrążona).

#### Dane

#### Klasyfikacja

Wada morfologiczna

Kod ORPHA  
268838

Kod OMIM  
-

Kod ICD10  
-

Kod ICD11  
-

---

#### [\\*Źródło](#)

orphanet

### Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)