

Opis choroby *

Definicja

*Neuroendokrynnny rak trzonu macicy o wysokim stopniu złośliwości jest niezwykle rzadkim, agresywnym pierwotnym nowotworem macicy, wywodzącym się z komórek neuroendokrynnnych rozproszonych w obrębie endometrium; makroskopowo charakteryzuje się obecnością w macicy masywnego guza często o charakterze polipowatym, z obfitą martwicą, zaś histologicznie - z obecnością struktur przypominających rozety i sznury, składające się z małych, okrągłych komórek z owalnymi jądrami i skąpą cytoplazmą. Pacjentki często zgłaszają dysfunkcjonalne krwawienia z macicy, obecność guza w miednicy lub w jamie brzusznej i szczególnie w późniejszych stadiach ból brzucha. Mogą wystąpić objawy związane z szerzeniem się przerzutów lub z zespołem paranowotworowym, który może przyjmować postać retinopatii lub zespołu Cushinga związanego z ektopowym wydzielaniem ACTH.

Dane

Klasyfikacja

Choroba

Synonimy

High-grade neuroendocrine carcinoma of the uterine corpus

Słabo zróżnicowany neuroendokrynnny rak endometrium

Słabo zróżnicowany neuroendokrynnny rak trzonu macicy

Poorly differentiated neuroendocrine carcinoma of the corpus uteri

Poorly differentiated neuroendocrine carcinoma of the endometrium

Kod ORPHA

213731

Kod OMIM

-

Kod ICD10

C54.8

Kod ICD11

-

*Źródło

orphanet

