

## Opis choroby \*

### Definicja

\*Niedojrzały guz neuroektodermalny szyjki macicy jest rzadkim nowotworem szyjki macicy, który wywodzi się z komórek grzebienia nerwowego, histologicznie zbudowany jest z małych, okrągłych komórek nowotworowych o różnym stopniu zróżnicowania w kierunku komórek nerwowych, glejowych i wyściółkowych. Makroskopowo guz jest często dużą, miękką, źle ograniczoną masą z naciekającymi brzegami i obszarami martwiczymi. Objawia się nieprawidłowym krwawieniem lub wydzieliną z pochwy, bólem w podbrzuszu i powiększeniem macicy.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

Cervical malignant peripheral neuroectodermal tumor  
Obwodowy rak neuroektodermalny szyjki  
Obwodowy rak neuroektodermalny szyjki macicy  
Cervical peripheral neuroectodermal cancer  
Malignant peripheral neuroectodermal tumor of the cervix uteri  
Peripheral neuroectodermal cancer of cervix uteri

#### Kod ORPHA

213812

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

C53.8

#### Kod ICD11

-

---

#### \*Źródło

orphanet