

## Opis choroby \*

### Definicja

Rzadka choroba skóry, która typowo charakteryzuje się tarczowatymi grudkami z 3 pierścieniami o koncentrycznym zróżnicowaniu kolorystycznym (ciemny środek otoczony jaśniejszym różowym pierścieniem i zewnętrznym czerwonym pierścieniem), symetrycznie rozmieszczonymi na powierzchniach prostowników kończyn lub bardziej rozproszonymi, którym towarzyszy 2 lub więcej zmian na błonach śluzowych (nadżerki błony śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych, odbytu, zapalenie spojówek, błony rzekome). Chorobę zwykle poprzedzają objawami prodromalne, takie jak złe samopoczucie, gorączka i bóle mięśni o samoograniczającym charakterze, które zwykle ustępuje samoistnie w ciągu kilku tygodni; niemniej istnieje ryzyko nawrotu. Chorobę wywołują głównie czynniki zakaźne (wirus opryszczki, mycoplasma pneumoniae), ale u pewnej podgrupy pacjentów wykrywane są autoprzeciwciała przeciw plakinom. Opisano rzadkie przypadki ciężkich następstw, dotyczących błon śluzowych.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

Erythema exsudativum multiforme majus

Rumień wielopostaciowy wysiękowy

Erythema multiforme majus

#### Kod ORPHA

502499

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

L51.8

#### Kod ICD11

-

---

#### \*Źródło

orphanet