

## Opis choroby \*

### Definicja

Rzadka choroba ogólnoustrojowa występująca u noworodków urodzonych przed 37 tygodniem ciąży, charakteryzująca się zagrażającą życiu dysfunkcją narządów wskutek nieprawidłowej odpowiedzi organizmu pacjenta na infekcję, która mogła zostać nabyta krótko przed lub w trakcie porodu (prowadząc do wczesnej posocznicy noworodków w ciągu pierwszych 72 godzin życia) lub po urodzeniu (prowadzące do późnej posocznicy noworodków w okresie pomiędzy 72 godziną a 3 miesiącem życia). Wczesniactwo jest jednym z głównych czynników ryzyka sepsy noworodków. Obraz kliniczny może rozwijać się stopniowo z podmiotowymi i przedmiotowymi objawami obejmującymi drażliwość, senność lub problemy w karmieniu, lub szybko przechodzić w niewydolność oddechową, gorączkę, hipotermię, niedociśnienie, wstrząs i niewydolność wielonarządową.

### Dane

### Klasyfikacja

Szczególna sytuacja w chorobie lub zespole

Kod ORPHA	Kod OMIM	Kod ICD10
90051	-	P36.9
<b>Kod ICD11</b>		
-		

---

### \*Źródło

orphanet