

## Opis choroby \*

### Definicja

Glomerulopatia immunotaktoidalna lub włókienkowa to grupa bardzo rzadkich chorób kłębuszków nerkowych, do której należy glomerulopatia immunotaktoidalna (ITG) i nieamyloidowa glomerulopatia włókienkowa (nieamyloidowa FGP), które charakteryzują się odkładaniem się w mezangium monoklonalnych depozytów mikrotubularnych lub poliklonalnych depozytów włókienkowych. W obydwu jednostkach występuje białkomocz pochodzenia nerkowego, krwiomocz i niedoczynność nerek w wielu przypadkach prowadząca do niewydolności. ITG jest najczęściej przejawem leżącej u jej podstaw choroby limfoproliferacyjnej, hipokomplementemii, dysproteinemii, gammopatii monoklonalnej lub utajonej krioglobulinemii. Nieamyloidowa FGP występuje 10 razy częściej niż ITG.

### Dane

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Synonimy</b>
Grupa fenomenów	Immunotactoid or fibrillary glomerulonephritis Immunotactoid or fibrillary glomerulonephritis

<b>Kod ORPHA</b>	<b>Kod OMIM</b>	<b>Kod ICD10</b>
91137	-	N03.6

**Kod ICD11**

-

---

### \*Źródło

orphanet