

# Pęcherzowe oddzielanie się naskórka dystroficzne zlokalizowane, forma przedpiszczelowa

## Kod Orpha: 79410 Kod OMIM: 131850

### Opis choroby \*

#### Definicja

A form of localized dystrophic epidermolysis bullosa characterized by the development of blisters, erosions, and lichenoid lesions predominantly in the anterior lower legs (pretibial areas and feet), the hands and nails. Individual lesions, which tend to be papular or plaque-like, are often violaceous. Pruritus is possible. Healing of blisters is associated with hypertrophic scarring and milia formation. Dystrophy of both fingernails and toenails is characteristic.

#### Dane

#### Klasyfikacja

Podtyp kliniczny

#### Synonimy

DEB-Pt  
Localized DEB, pretibial form  
DEB-Pt  
Localized DEB, pretibial form

#### Kod ORPHA

79410

#### Kod OMIM

131850

#### Kod ICD10

Q81.2

#### Kod ICD11

-

---

#### [\\*Źródło](#)

orphanet

### Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

**Orphanet** - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -  
Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)