

Wrodzona niedokrwistość dyserytopoetyczna typu II

Kod Orpha: 98873 Kod OMIM: 224100

Opis choroby *

Definicja

Wrodzona niedokrwistość dyserytopoetyczna typu II jest najczęstszą formą CDA (zobacz te terminy) i charakteryzuje się niedokrwistością, żółtaczką i splenomegalią, często prowadzi do gromadzenia się żelaza w wątrobie i kamieni żółciowych.

Dane

Klasyfikacja

Choroba

Synonimy

CDA II
CDA II
CDA typu 2
CDA typu II
SEC23B-CDG
Wrodzona erytroblastyczna wielojąderkowość z dodatnim testem kwasowości (hempas)
Wrodzona niedokrwistość dyserytopoetyczna typu 2
CDA type 2
CDA type II
Congenital dyserythropoietic anemia type 2
Hereditary erythroblastic multinuclearity with a positive acidified-serum test (hempas)
SEC23B-CDG

Kod ORPHA

98873

Kod OMIM

224100

Kod ICD10

D64.4

Kod ICD11

3A73

[*Źródło](#)

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl