

# Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplastyczne związane z inhibitorem topoizomerazy typu 2

**Kod Orpha: 102381 Kod OMIM:**

## Opis choroby \*

### Definicja

A subgroup of therapy-related myeloid neoplasms (t-MN), associated with treatment of an unrelated neoplastic disease with cytotoxic agents, like etoposid, doxorubicin, daunorubicin and others. The neoplastic cells often show rearrangements involving the mixed lineage leukemia gene at 11q23. This subgroup of t-MN is typically associated with overt leukemia, without preceding myelodysplastic syndrome, developing 2-3 years after exposure, presenting with non-specific symptoms related to ineffective hematopoiesis (fatigue, bleeding and bruising, recurrent infections, bone pain) and/or extramedullary site involvement.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

AML and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor  
AML i zespoły mielodysplastyczne związane z inhibitorem topoizomerazy typu 2

#### Kod ORPHA

102381

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

C92.0

#### Kod ICD11

2A60.20

---

[\\*Źródło](#)

orphanet

## Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

**Orphanet** - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -  
Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)