

## Opis choroby \*

### Definicja

\*Wtórna jamistość rdzenia jest rzadką chorobą rdzenia kręgowego, w której dochodzi do powstania wypełnionej płynem jamy lub przetoki w rdzeniu kręgowym w wyniku blokady krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego (np. z powodu zapalenia pajęczynówki, raka opon mózgowo-rdzeniowych, obecności zmian guzowatych o różnym charakterze) uszkodzenia rdzenia kręgowego (np. w wyniku urazu, martwicy popromiennej, krwotoku, ropnia kręgosłupa), dysrafii rdzenia kręgowego lub guzów wewnątrzrdzeniowych. Objawia się bólem neuropatycznym, drętwieniem, osłabieniem mięśni, zmianami napięcia lub spastycznością mięśni lub zaburzeniami układu autonomicznego (nadmierne pocenie się, niestabilność akcji serca lub ciśnienia tętniczego krwi). Klasycznym objawem jest selektywna utrata czucia bólu i temperatury przy względnym zachowaniu funkcji sznurów grzbietowych (czucie dotyku i ucisku).

### Dane

### Klasyfikacja

Choroba

**Kod ORPHA**

99857

**Kod OMIM**

-

**Kod ICD10**

G95.0

**Kod ICD11**

8D66.1

---

### \*Źródło

orphanet