

# Reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi

## Kod Orpha: 139402 Kod OMIM:

### Opis choroby \*

#### Definicja

Rzadka reakcja nadwrażliwości, która charakteryzuje się uogólnioną, naciekową wysypką skórą z obrzękiem twarzy, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, eozynofilią, limfocytozą i mniej lub bardziej nasilonym zajęciem narządów trzewnych (np. zapaleniem wątroby, zapaleniem nerek, zapaleniem płuc, zapaleniem mięśnia sercowego itp.) oraz, u niektórych pacjentów, reaktywacją ludzkiego wirusa opryszczki 6, wirusa Epsteina-Barr i/lub wirusa cytomegalii. Początek choroby pojawia się zwykle 2-8 tygodni po podaniu leku sprawczego i jest najczęściej związany ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych, przeciwbakteryjnych sulfonamidów i allopurynolu, ale w patogenezę zaangażowanych może być także wiele innych leków. Obraz histologiczny charakteryzuje się powierzchniowym zapaleniem skóry, czasem w połączeniu z wypryskiem i ostrą uogólnioną osutką o wzorcu krostkowym. Mogą wystąpić powikłania autoimmunologiczne.

#### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

DRESS syndrome  
Polekowa eozynofilia z objawami ogólnymi  
Zespół DRESS  
Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms

#### Kod ORPHA

139402

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

T78.4

#### Kod ICD11

EH65

---

[\\*Źródło](#)

orphanet

## **Rozszerzony opis choroby**

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

**Orphanet** - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -  
Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)