

Brachdaktylia - dysplazja łokciowo-nadgarstkowa

Kod Orpha: 1275 Kod OMIM: 186550

Opis choroby *

Definicja

*Brachydaktylia - dysplazja łokciowo-nadgarstkowa jest rzadkim, genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwoju kości, który charakteryzuje się dysplazją wszystkich elementów kostnych stawu łokciowego, nieprawidłowo ukształtowanymi kośćmi nadgarstka, odchyleniem w stronę kości promieniowej stawu nadgarstkowego i brachydaktylią (skróceniem palców). Łokcie pacjentów ułożone są zwykle w łagodnej pozycji zgięciowej (brak możliwości czynnego wyprost), a zakres ruchów w stawie łokciowym, nadgarstku i stawach palców jest ograniczony. Opisywano również występowanie kamptodaktylii (przykurcz palców) i syndaktylii (zrośnięcie palców).

Dane

Klasyfikacja

Zespół wad wrodzonych

Synonimy

Brachydactyly-joint dysplasia syndrome
Brachydaktylia - dysplazja stawów
Zespół Liebenberga
Liebenberg syndrome

Kod ORPHA

1275

Kod OMIM

186550

Kod ICD10

Q73.8

Kod ICD11

LD26.1

[*Źródło](#)

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl