

# Hiperlipidemia z powodu niedoboru wątrobowej lipazy triglicerydowej

**Kod Orpha: 140905 Kod OMIM: 614025**

## Opis choroby \*

### Definicja

Hyperlipidemia due to hepatic triacylglycerol lipase deficiency is a rare, genetic hyperalphalipoproteinemia disorder characterized by elevated plasma cholesterol and triglyceride (TG) levels with a marked TG enrichment of low- and high-density lipoproteins (HDL), presence of circulating beta-very low density lipoproteins and elevated HDL cholesterol levels, in the presence of a very low, or undetectable, postheparin plasma hepatic lipase activity. Premature atherosclerosis and/or coronary heart disease may be associated.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

Hyperlipidemia due to HL deficiency  
Hyperlipidemia due to HTGL deficiency  
Hyperlipidemia due to hepatic lipase deficiency  
Hyperlipidemia due to hepatic triglyceride lipase deficiency

#### Kod ORPHA

140905

#### Kod OMIM

614025

#### Kod ICD10

E78.4

#### Kod ICD11

-

---

[\\*Źródło](#)

orphanet

## Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

**Orphanet** - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -  
Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)