

Anomalia drugiego łuku skrzelowego

Kod Orpha: 141022 Kod OMIM: 113600

Opis choroby *

Definicja

A rare otorhinolaryngological malformation characterized by the presence of a cyst, sinus or fistula occurring along the anterior border of the sternocleidomastoid muscle. Second branchial cleft fistulae and sinuses present with skin opening with chronic discharge and recurrent infections, whereas second branchial cleft cysts present as a painless, nontender, stable in size or slowly enlarging lateral neck masses. Cysts occasionally acutely increase in size during upper respiratory tract infection, leading to respiratory compromise, torticollis, and dysphagia.

Dane

Klasyfikacja

Wada morfologiczna

Synonimy

Second branchial cleft cyst

Przetoka drugiego łuku skrzelowego

Torbiel drugiego łuku skrzelowego

Second branchial cleft fistula

Kod ORPHA

141022

Kod OMIM

113600

Kod ICD10

Q18.0

Kod ICD11

-

*[Źródło](#)

[orphanet](#)

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - interntowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl