

Nabyta limfohistiocytoza hemofagocytarna towarzysząca nowotworowi złośliwemu

Kod Orpha: 158057 Kod OMIM:

Opis choroby *

Definicja

*Nabyta limfohistiocytoza hemofagocytarna towarzysząca nowotworowi złośliwemu jest rzadką wtórną limfohistiocytozą hemofagocytarną, która pojawia się równocześnie z początkowymi objawami choroby nowotworowej lub na dowolnym etapie chemioterapii. Zazwyczaj towarzyszy takim nowotworom jak białaczki, chłoniaki z limfocytów B, limfocytów T lub komórek NK lub chłoniak Hodgkina. Typowe objawy kliniczne obejmują gorączkę, powiększenie wątroby i śledziony oraz cytopenię w połączeniu ze specyficznymi wynikami badań laboratoryjnych.
inf brsup inf brsup

Dane

Klasyfikacja

Szczególne sytuacja w chorobie lub zespole

Kod ORPHA
158057

Kod OMIM
-

Kod ICD10
D76.1

Kod ICD11
3B62.Y

[*Źródło](#)

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl